ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FONOAUDIÓLOGO

*** ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE**
*** Neste Caderno de Questões, você encontra:**
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

*** Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.**
*** Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.**
*** O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.**
*** Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.**
*** Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.**
*** Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.**
*** Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.**
*** O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/09/2011, no site www.acaplam.com.br.**
*** Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO de 21/06/2011.**

*** Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.**

BOA PROVA!!

Data: 25 de Setembro de 2011.

PCI Concursos
acaplam
www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

PARTE I - FONOAUDIÓLOGO

01 - A Videofluoroscopia é um exame de grande utilidade para a avaliação fonoaudiológica das disfagias. Leia com atenção as alternativas abaixo sobre o tema em questão e assinale a alternativa correta.

A) Nos casos de pacientes com miastenia gravis é importante testar rapidamente a deglutição para diferentes consistências antes que ocorra fadiga muscular e impossibilite sua testagem videofluoroscópica.
B) A Videofluoroscopia é o método *Gold Standard* para análise da deglutição em pacientes mais graves como: em presença de secreção endotraqueal, reflexo faríngeo e de tosse comprometido e comprometimento respiratório grave. Dando mais segurança para o terapeuta testar várias consistências alimentares e manobras facilitadoras.
C) Usualmente o exame é realizado com o paciente sentado nas posições látero-lateral e ântero-posterior, seguindo sempre a seguinte seqüência de protocolo de deglutição: 2 ml, 5 ml, 7 ml e 10 ml de alimento nas consistências líquida, pastosa, semi-sólida e sólida.
D) O exame Videofluorográfico é considerado bastante sensível na avaliação da disfagia neurogênica, mas não é topográfico em relação à desordem neurogênica causadora da doença.
E) Durante a fase faríngea da deglutição, por meio da visão lateral do exame é possível verificar resíduo em valécula/seios piriformes uni ou bilaterais, aspiração antes, durante e após a deglutição e presença de refluxo gastroesofágico.

02 - Os AVCs são uma das principais causas da disfagia do tipo neurogênica, e a sua extensão e localização no Sistema Nervoso Central é fundamental para a compreensão do quadro clínico do paciente. Assinale a alternativa correta quanto as conseqüências do AVC e suas repercussões sob o ponto de vista fonoaudiológico.

A) Os grandes AVCs unilaterais causam disfagia pela interrupção da comunicação corticobulbar contralateral (cápsula interna) que liga o centro de controle cortical da deglutição ao núcleo bulbar, que coordena a deglutição.
B) Os AVCs do tipo hemorrágico parecem ocorrer com maior freqüência e tendem a ter conseqüências mais graves que o AVC isquêmico, no entanto, os acidentes de tronco cerebral, apesar de mais raros, tendem a causar disfagia com bastante freqüência.
C) Em casos de afecções predominantemente nos neurônios motores superiores dos tratos corticobubares resultarão com freqüência sintomas como: disfagia, distrofia, diminuição no suporte respiratório, hipernasalidade e disartria acompanhada de fraqueza muscular.
D) A disfagia orofaríngea pode ser classificada, de acordo com a etiologia, em: Neurogênica, Traumática, anatômica, neuromuscular, psicogênica, decorrente da idade.
E) As lesões no Hemisfério Direito parecem afetar mais a fase faríngea da deglutição, enquanto as lesões no Hemisfério Esquerdo parecem afetar mais a fase oral da deglutição.

03 - Representam características fonoaudiológicas de pacientes com Classe II de Angle.

A) Elevação do palato mole; encurtamento da musculatura suprahioidea; língua em soalho/elevação do dorso.
B) Distorção do /p/, /b/, /m/; palato mole verticalizado; hipofunção e alongamento da musculatura mastigatória.
C) Palato mole verticalizado, hipofunção do lábio inferior, hipercontração do mentual.
D) Anteriorização mandibular em função; participação exagerada da musculatura perioral e deglutição com movimentos póstero-anterior de língua; hiperfunção do lábio superior.
E) Distorção dos fonemas bilabiais; retração do lábio superior e hipotonia do lábio inferior e hiperatividade do mentual; palato mole verticalizado.

04 - Com relação ao Sistema Estomatognático, suas estruturas e funções; assinale a alternativa incorreta.

A) Os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, com exceção do músculo palatoglosso possuem mesma origem embriogênica, no entanto, todos são inervados pelo nervo Hipoglosso.
B) Para que ocorra uma mastigação e deglutição eficiente, é necessário o trabalho em sincronia de vários grupos musculares inervados pelos nervos: V, VII, IX, X, XI, XII.
C) De modo conjunto a função Estomatopônica, a Estomatognosia representa uma função motora na qual há participação da mandíbula e pode ser classificada em: Exteroceptiva, Interoceptiva, Proprioceptiva e Visceroceptiva.
D) A deglutição aparece como a 1ª função estomatognática a manifestar-se no feto, o movimento de deglutição inicia-se por volta do 2º trimestre de gestação, ou seja, 12ª semana de vida intra-uterina.
E) Em condições normais, aos 07 meses de idade iniciam-se os movimentos de lateralização de língua; a língua começa a lateralizar os alimentos.

05 - "A constituição da inteligência se dá graças a um sistema complexo de esquemas que permite a interação do sujeito com o mundo e garante a construção de conhecimentos. Assim sendo, a atividade lúdica, ou brincadeira, assim como a imitação, depende do desenvolvimento cognitivo, refletindo relações variáveis entre assimilação e acomodação". Assinale a alternativa que represente o teórico que defende este ponto de vista, assim como a classificação para a sua teoria do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem na criança.

A) Vygotsky – Sociointeracionista..
B) Chomsky – Inatismo.
C) Vygotsky – Construtivista.
D) Piaget – Construtivista.
E) Piaget – Sociointeracionista.

www.pciconcursos.com.br

06 - Com relação à Articulação Têmporo-Mandibular (ATM) e seus movimentos mandibulares, analise as alternativas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F) e em seguida assinale a opção correta.

( ) O músculo digástrico, como os demais músculos mastigatórios, são inervados pelo nervo trigêmio (V par craniano) onde seus feixes musculares inserem-se em sua totalidade no osso hióide, além de quando contraídos auxiliam no abaixamento da mandíbula.

( ) O músculo pterigoideo lateral é o principal abaixador da mandíbula. É um músculo que exerce função moduladora, permitindo ou não, qualquer função condilar.

( ) A ATM humana apresenta dois movimentos principais: Translação e Rotação. A Translação pode ser: Lateral, quando o côndilo desloca-se lateralmente ao longo da cavidade condilar pela contração do músculo temporal posterior no fechamento bucal, e na abertura pelo pterigóideo lateral; Ântero-posterior, quando o côndilo segue planos de declive, determinados pela contração do músculo pterigoideo lateral durante abertura bucal, e no fechamento, pela contração do temporal e pterigoideo lateral.

( ) No movimento mandibular de abertura de boca há participação dos músculos infra e supra-hioideos para estabilizar o osso hióideo e permitir o abaixamento da mandíbula para contração bilateral dos supra-hioideos em associação com o pterigóideo lateral superior simutâneo ao relaxamento dos elevadores da mandíbula, e conseguinte, contração bilateral dos pterigóideos laterais.

( ) A protrusão de mandíbula é conseguida graças à ação conjunta dos pterigóideos laterais mediais e feixes posteriores dos temporais.

A) V, V, F, F, V.
B) F, F, V, V, F.
C) V, F, V, V, F.
D) F, V, V, F, F.
E) F, V, F, F, F.

07 - Zorzi (2004) ainda cita 04 (quatro) diferentes procedimentos utilizados na avaliação da Linguagem na criança. Assinale a alternativa correta.

A) Em se tratando de avaliação da linguagem, quatro procedimentos podem ser diferenciados com diferentes objetivos: Testes Psicolingüísticos, Neuroevolutivo da Linguagem, Observação Comportamental e Lingüístico-Cognitivo.
B) A análise por Observação Comportamental e por classificação em escalas de desenvolvimentos são procedimentos que podem ser utilizados com crianças desde o nascimento e se aplica aos diversos aspectos de desenvolvimento infantil.
C) Os testes Psicolínguísticos e Lingüístico-Cognitivo podem ser utilizados quando a criança ainda não apresenta oralidade, já que tem por objetivo verificar a ocorrência dos diferentes níveis lingüísticos.
D) O método de avaliação Lingüístico objetiva-se a verificar a organização dos seguintes aspectos: fonética, fonologia, sintaxe e pragmática da linguagem oral.
E) Na Metanálise do discurso dirigido, o Terapeuta procura verificar os aspectos globais da produção e compreensão da linguagem oral, tornando-se um dos principais recursos terapêuticos na prática clínica.

08 - Com relação ao Recém-Nascido (RN) de risco, analise as alternativas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F) e em seguida assinale a opção correta.

( ) O peso ao nascer varia conforme a idade gestacional, o estado nutricional e hidroeletrolítico materno e do recém-nascido. O RN com oferta nutricional adequada deve crescer de 20 a 40g por dia, conforme as curvas de crescimento intra-uterino.

( ) O RN com Idade Gestacional < 36 semanas é considerado RN Pré-Termo; com idade gestacional entre 36 e 41 semanas é considerado RN a Termo; idade gestacional > 41 semanas é considerado RN Pós-Termo.

( ) O uso da gavagem contínua reduz a ocorrência de apnéias, de distensão abdominal e de refluxo gastro-esofágico, porém, aumentaria a ocorrência de infecções e de alterações físico-químicas da dieta infundida.

( ) Em RN abaixo de 34 semanas de idade gestacional a alimentação deve sempre ser iniciada através de gavagem, contínua ou intermitente, orogástrica ou nasogástrica, no entanto, nos RN Pré-Termo com 36 semanas, a sucção no seio materno não deverá deixar de ser introduzida a partir das primeiras semanas em todos os bebês de risco.

( ) O reflexo de GAG está presente consistentemente e funcional entre a 32ª e 33ª semana de idade gestacional. O mecanismo nervoso responsável se dá através das aferências do V, IX, e pares cranianos, e as vias eferentes do V, VII, IX, X, XI e XII pares, além da C1 e C2 para extensão de cabeça.

A) V, V, F, V, V.
B) V, F, V, F, V.
C) F, F, V, V, V.
D) F, V, F, F, F.
E) V, F, F, F, V.

09 - Com relação às crianças Disléxicas, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

A) A dislexia é um distúrbio do aprendizado que se manifesta inicialmente pela dificuldade em aprender a leitura e a escrita decorrente de algum déficit intelectual-perceptual sem que tenha ocorrido por qualquer privação socioeconômica, por técnicas deficientes de ensino ou lesão cerebral.
B) Apresenta maior vulnerabilidade no sexo masculino e de modo genético autossômico dominante.
C) Uma das teorias que explica a dislexia seria a incapacidade do processamento de alterações rápidas de estímulos ou sucessão deles, tanto na modalidade auditiva como visual.
D) A Fonoaudiologia oferece importantes recursos na reabilitação da dislexia, com exercícios para o treino perceptivo visual-auditivo na leitura, ou nas habilidades básicas para obtê-las.
E) Antes de chegar ao diagnóstico de dislexia é importante haver exclusão de alterações que podem resultar num falso diagnóstico como: deficiência visual ou auditiva; epilepsia; ensino fraco, educador desqualificado e fatores culturais; uso de medicamentos; distúrbios do sono.

www.pciconcursos.com.br

10 - Ainda se referindo aos Recém-Nascidos (RN) de risco, assinale a alternativa correta.

A) Normalmente os RN Pré-Termo menores que 34 semanas de gestação não podem receber o alimento pela via oral, numa fase inicial, portanto, outras formas de oferecer o alimento são utilizadas como: via parenteral e enteral, por sonda, até apresentarem condições de coordenação na alimentação por via oral.
B) A intervenção fonoaudiológica deverá ser por completo interrompida nos casos de: instabilidade cardíaca, pulmonar e gástrica, ausência dos reflexos de defesa e oscilação no estado de alerta.
C) Nos casos de RN Pré-Termo com quadro de hipertonia de músculos orofaciais é muito comum presença de excursão excessiva de mandíbula. A estimulação deverá ser realizada por meio de massoterapia com toques sutis e rápidos, tapping, crioterapia, redução da hiperextensão cervical e estimular a sucção em prono.
D) Quando houver um caso de traqueolaringomalácia a conduta é posicionar o RN para alimentação com alongamento da região cervical com maior flexão de cabeça, além de promover pausas mais longas para que recupere a ventilação, fracionar a dieta com espaço maior entre as mamadas.
E) Na seqüência de Pierre Robin é muito comum obstrução das vias aéreas superiores pela glossoptose. Nos casos menos graves o bebê é colocado em decúbito dorsal como medida de segurança durante o seu repouso e cânula nasofaríngea ou mesmo traqueostomia é indicado nos quadros mais graves de obstrução de vias aéreas superiores.

11 - Com relação às Perdas Auditivas Sensorial e Neural e o diagnóstico diferencial entre estas duas causas, analise as alternativas e assinale a opção incorreta.

A) Nas Sensoriais, a curva audiométrica costuma apresentar limiares melhores nos tons mais graves, enquanto nas Neurais os limiares tonais podem apresentar as mais variadas.
B) Na maioria das vezes, sua alteração é proporcional à perda auditiva, pode ser um pouco menos acentuada quando o perfil audiométrico é plano e mais acentuado quando a lesão é Neural.
C) Nas Perdas Auditivas Neurais é comum os pacientes relatarem que escutam mas não entendem em virtude do comprometimento da discriminação que geralmente são mais acentuadas nas Neurais em comparação às Sensoriais. A Logoaudiometria é bem típica nas Perdas Auditivas Neurais.
D) Na imitanciometria, apresenta reflexos "recrutantes" nas perdas Neurais, enquanto nas Sensoriais dificilmente encontramos respostas e, quando existem, não são recrutantes.
E) No teste de SISI apresenta índice em torno de 100% nas perdas Sensoriais e bem baixos nas Neurais, assim como curva tipo II ou III na avaliação de Békèsy para as Perdas do tipo Sensoriais e IV e V nas Perdas do tipo Neurais.

12 - Segundo ZORZI (2004), o Protocolo de Observação Comportamental (PROC) é um recurso bastante utilizado na clínica fonoaudiológica de linguagem para avaliação do desenvolvimento comunicativo e cognitivo infantil. A partir destas informações, assinale a alternativa correta com relação a este recurso avaliativo.

A) A Observação Comportamental é um procedimento pelo qual se analisa o comportamento geral da criança em sua livre produção a partir de contextos não-estruturados, no entanto, direcionados para a avaliação da linguagem oral em sua excelência.
B) A Observação Comportamental é um recurso utilizado em crianças que já tenham adquirido oralidade e estejam em pleno processo de ampliação lexical, pois torna-se uma excelente estratégia para avaliar o desenvolvimento comunicativo e cognitivo infantil.
C) Se por um lado o PROC possui a função de procurar configurar os níveis evolutivos e modos de funcionamento cognitivo e comunicativo pelas crianças com queixas de atraso ou distúrbios no desenvolvimento, por outro lado, o objetivo principal será em promover uma compreensão mais precisa a respeito do que se considera evolução normal e do relacionamento entre tais aspectos do desenvolvimento.
D) O procedimento deve ser organizado no sentido de propor uma situação planejada na qual se possa observar e planejar, preferencialmente em vídeo, a interação de crianças entre 18 e 36 meses.
E) Apesar do PROC ser um ótimo recurso avaliativo, capaz de mostrar as diversas nuanças existentes no comportamento infantil, mas é incapaz de contemplar todos os aspectos e nem de longe ser suficiente para quantificar habilidades tão complexas como a linguagem e a cognição.

13 - Assinale (1) para as características dos nódulos vocais e (2) para dos pólipos de prega vocal, em seguida, marque a alternativa correta.

( ) Avermelhados no início, rígidos e esbranquiçados nos quadros antigos.
( ) Quando ocorre na criança, a incidência é maior nos meninos e a causa está quase sempre ligada a comportamento vocal inadequado.
( ) Ocorre na borda livre da prega vocal, em mulheres é comum estar associado a alterações estruturais mínimas com comportamento vocal inadequado.
( ) Os pacientes apresentam rouquidão característica, com soprosidade variável, observa-se muitas vezes freqüência fundamental dicrótica.
( ) O tratamento é quase sempre cirúrgico, mas fonoterapia é indicado no pré e pós-cirúrgico para reduzir o edema e melhorar a qualidade vocal e favorecer novos ajustes na produção vocal.

A) 2, 1, 1, 2, 2.
B) 2, 1, 2, 2, 2.
C) 1, 1, 2, 2, 2.
D) 1, 2, 1, 2, 1.
E) 1, 2, 1, 1, 2

www.pciconcursos.com.br

14 - Assinale a alternativa que contenham informação que justifique corretamente a correlação entre a Hidropsia Endolinfática e suas conseqüências do ponto de vista audiológico.

A) A Doença de Meniere é caracterizada pela hidropsia endolinfática. As causas são inúmeras, porém, o mecanismo pelo qual ela ocorre ainda é desconhecido.
B) Assim como nas Perdas Auditivas Sensoriais, a hidropsia apresenta curva audiométrica descendente, ou seja, com limiares audiométricos melhores em tonalidades mais graves.
C) A hidropsia endolinfática aguda tem sido uma das causas mais freqüentes de surdez de evolução gradual unilateral. O aumento brusco da pressão no espaço endolinfático pode determinar ruptura de membranas endolinfáticas.
D) O prognóstico parece não estar relacionado à gravidade da deficiência auditiva inicial. Quando ocorre rebaixamento de início nas freqüências da fala, não costuma possuir alguma relação com uma possível recuperação favorável.
E) A tríade sintomatológica é composta por zumbido, perda auditiva e vertigem em episódios paroxísticos, além de envolvimento do Sistema Nervoso Central que ocorre sem perda de consciência, presença de nistágmo espontâneo, náusea/vômito, plenitude aural e zumbido no lado afetado.

15 - Quanto ao desenvolvimento normal da Linguagem e dos processos fonológicos encontrados em crianças em fase de aquisição da linguagem, assinale a alternativa correta.

A) Processo Fonológico é definido como uma desorganização no planejamento motor oral durante a fala, em que a criança reduz e substitui sons por outros, em função deles apresentam maior complexidade do ponto de vista perceptivo e articulatório.
B) Dentre os processos fonológicos de desenvolvimento mais freqüente nas crianças são: plosivização, frontalização de velar, posteriorização de velar, frontalização de palatal, simplificação de líquidas, eliminação de consoante final, simplificação de encontro consonantal, ensurdecimento de plosivas e fricativas.
C) Os processos fonológicos englobam as omissões e as substituições de fonemas simples, de encontros consonantais e também de estruturas silábicas, ocasionando dificuldade na produção correta dos sons, distorcendo-os e comprometendo a inteligibilidade de fala.
D) Além do tratamento fonoaudiológico pelo modelo tradicional que tem por objetivo a correção dos sons, há alguns modelos fonoaudiológicos propostos, como os pares mínimos, traços distintivos, dos ciclos e a ortoépia.
E) Para iniciar a terapia pode selecionar os processos de maior ocorrência como, por exemplo: simplificação de fricativa velar e a plosivização. Há duas possibilidades de apresentação dos pares mínimos, através da oposição mínima e da oposição máxima.

16 - Durante o desenvolvimento da linguagem, é muito comum na produção oral da criança a presença de falhas durante sua emissão, alguns podem ser considerados como integrantes do desenvolvimento e logo superados a partir da experiência com a linguagem e maturação das estruturas interligadas à fala, no entanto, há outros que não podem ser considerados do desenvolvimento. Analise as alternativas de I a V e em seguida, assinale a alternativa correta.

I- O Inventário fonético para os fonemas simples do português estará completo aos 5,6 anos de idade, em condições normais de desenvolvimento.
II- Estatisticamente os processos fonológicos mais simples de serem superados pelas crianças são a redução de sílaba, harmonia consonantal e frontalização de palatal; em contrapartida a simplificação da consoante final e simplificação de encontro consonantal são os últimos a serem superados.
III- Trocas fonêmicas como por exemplo: Boca – "pola"; gato – "cato"; janela – "chanela", representam processos fonológicos de desenvolvimento e considera-se que por volta dos 4,6 anos, as crianças deixarão de usar grande parte desses processos fonológicos.
IV- Aos 7 anos de idade espera-se que a criança, em condições normais, tenha eliminado os processos fonológicos, porém a partir dos 4,6 anos sua fala deve estar bem inteligível.
V- A idade de domínio dos encontros consonantais (dr, fr, kl, fl) ocorre de modo simultâneo a superação dos processos fonológicos de posteriorização para palatal, frontalização de palatal, que ocorre por volta dos 4,6 anos.

A) I, III e IV estão corretas.
B) I, II e V estão corretas.
C) I, IV e V estão corretas.
D) II e III estão corretas.
E) Todas estão corretas.

17 - Com relação à testagem audiológica em crianças entre 0-2 anos de idade. Assinale a alternativa correta.

A) O teste de condicionamento do reflexo de orientação baseia-se no condicionamento reflexo da criança quando é apresentado um estímulo sonoro comum a criança, em que a mesma tenderá a procurar a fonte ou a origem do estímulo.
B) As respostas comportamentais de localização direta dos sons no plano lateral e localização indireta abaixo do ouvido é possível de ser encontrada em bebês entre 4-7 meses de idade a partir de ruídos instrumentais entre 40-50 dBNA.
C) A audiometria de condicionamento operante com reforço real envolve simplesmente a aprendizagem da criança em realizar um ato motor logo após apresentação de um estímulo sonoro.
D) Para aplicação da logoaudiometria nessas crianças, devemos inserir o procedimento no contexto de uma estória ou de uma atividade lúdica. É fundamental, contudo, que seja pesquisado o limiar de recepção de fala (SRT). Pois iniciaremos a pesquisa dos limiares tonais usando uma intensidade 30 dB acima deste.
E) Na audiometria com reforço visual, em condições normais, crianças entre 6 a 9 meses de idade devem apresentar níveis mínimos de resposta a 60 dBNa; entre 9 e 12 meses, 40 dbNA; entre 12 e 15 meses, 20 dBNa.

www.pciconcursos.com.br

18 - Com relação ao tema “Autismo”, assinale a alternativa incorreta.

A) Transtornos como o retardo mental e o transtorno autístico quando em graus de menor severidade, apresentam maior probabilidade de sofrimento psíquico, pois elas têm consciência de suas diferenças e, sem a capacidade criativa de “inventar” novas estratégias para modificar a própria conduta social, sofrem com seus desajustes e tornam-se solitárias.
B) Torna-se evidente que as alterações na comunicação verbal e não verbal, de recepção e de expressão estão presentes em todos os autistas e que o problema não é só a quantidade de fala que a criança com autismo apresenta, mas também, as falhas em diferentes funções da linguagem.
C) A presença/ausência da linguagem é considerada sinal preditivo do desenvolvimento, e sujeitos com autismo que desenvolveram tais habilidades antes dos 05 anos mostram maior competência intelectual e de inserção social em sua vida futura.
D) Na rotina fonoaudiológica com pacientes autistas, a proposta lúdica deverá ser sempre privilegiada ao analisar as eventuais diferenças de comportamento em situações não direcionadas e sempre espontâneas, pois o terapeuta deverá buscar interação com criança a partir da conduta de aproximação com a criança para que esta se sinta à vontade e permita interação e não o contrário.
E) Situações de dramatização podem ser utilizadas na terapia com a finalidade de busca da representação simbólica associada à capacidade de se colocar em diferentes papéis e contexto, portanto, todas as habilidades individuais devem ser utilizadas como recurso terapêutico, inclusive a capacidade de leitura e escrita.

19 - São causas de deficiências auditivas Sensorioneural de início e evolução gradual.

A) Schwannoma vestibular, neurite do VIII par, parotidite epidêmica, surdez ocupacional.
B) Presbiacusia, surdez ocupacional, trauma acústico, otospongiose coclear.
C) Fístula perilinfática, hidrópsia endolinfática, presbiacusia, trauma acústico.
D) Ototóxicos como antibióticos injetáveis e alguns diuréticos, doenças infecciosas sistêmicas como febre tifóide, shwannoma vestibular, presbiacusia.
E) Hidropsia endolinfática, fístula perilinfática, neurite do VIII par, surdez ocupacional.

20 - O termo transtorno de aprendizagem foi adotado, segundo o CID-10 (OMS, 1992) para indicar um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível e associado, na maioria dos casos, a sofrimento e a funções pessoais, que ocorrem na infância. Os distúrbios específicos de leitura e escrita estão diretamente ligados aos transtornos de aprendizagem, portanto, analise as proposições abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa correta com base na normatização do CID-10 quanto aos distúrbios da aprendizagem.

( ) Os transtornos de aprendizagem tem início sempre na Infância e tais comportamentos diminuem progressivamente à medida que a criança cresce.
( ) Aparecem sempre ligadas à maturação biológica do Sistema Nervoso Central.
( ) Tem curso estável e as funções afetadas incluem linguagem, habilidade visuoespaciais e/ou condições motoras.
( ) Há histórico familiar de transtornos similares e fatores genéticos que têm importância na etiologia.
( ) Fazem parte da categoria dos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares as seguintes subcategorias: o retardo mental, os déficits neurológicos grosseiros, os problemas visuais ou auditivos e as perturbações emocionais.

A) V, F, V, V, F.
B) V, F, V, F, V.
C) V, V, V, V, V.
D) F, F, V, V, V.
E) F, F, V, V, F.

21 - Assinale a alternativa incorreta quanto às características principais do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), assim como sua influência nos distúrbios de leitura e escrita.

A) Possui causa genética e provavelmente houve um fator desencadeante para que ele se manifeste. Costuma se manifestar na infância quando ela começa a vida escolar.
B) Há diferenças peculiares entre os sexos. Meninas com TDAH tendem a serem mais desatentas, quietas e reclusas, em contrapartida, os meninos com TDAH tendem a serem mais agitados e impulsivos.
C) A dislexia pode ser confundida com TDAH devido as características como falta de domínio com leitura ou escrita. A avaliação neurofisiológica é fundamental para melhor interpretação e diagnóstico adequado.
D) Crianças com TDAH com freqüência vão mal nos estudos, apresentam baixo limiar de atenção/concentração, possuem dificuldades em apropriar-se de regras gramaticais, apresentam dificuldade na leitura e muitos erros na escrita. Além delas possuírem a capacidade de fazerem muitas tarefas ao mesmo tempo finalizando todas mesmo quando não solicitadas.
E) A criança hiperativa é desatenta e tende a ser negligenciada, pois sua falta de atenção por vezes é taxada de preguiça e desleixo, fazendo com que seus pais punam a criança constantemente.

PCI Concursos
www.pciconcursos.com.br

22 - As proposições abaixo representam informações sobre o uso do Aparelho de Amplificação Sonoro Individual (AASI) e sua indicação para os determinados tipos de deficiências auditivas. Analise as proposições de I a V e julgue-as em verdadeiras ou falsas, em seguida assinale a alternativa correta.

I – Deficiências auditivas mínimas que não trazem praticamente nenhum prejuízo a um adulto podem representar dificuldades importantes para as crianças.

II – Nas crianças com surdez bilateral que, salvo contra-indicação, devem receber próteses auditivas binaurais, mesmo quando não há certeza de que lhes resta alguma audição a ser estimulada.

III – O fenômeno de privação auditiva também pode ocorrer em adultos com perda auditiva neurossensoriais bilaterais usuários de uma única prótese auditiva, reduzindo o índice de reconhecimento de fala na orelha não protetizada que ocorre geralmente após 02 anos de uso monoaural do aparelho.

IV – As vantagens da prótese auditiva do tipo intracanal são o custo mais acessível, a facilidade de inserção e remoção, além de ganho acústico e saída máxima elevados e presença de microfones direcionais.

V – As próteses auditivas do tipo intracanal são versáteis e podem ser adaptadas a todos os tipos de graus de perda auditiva, porém, a maior atenção deverá ser dada quanto à realimentação acústica e ao ganho acústico nas perdas mais elevadas.

A) I, III, IV e V estão corretas.
B) I e III estão corretas.
C) II, IV e V estão corretas.
D) I, II e III estão corretas.
E) II e IV estão corretas.

23 - Como parte integrante da avaliação audiológica, os testes eletrofisiológicos são recursos extremamente úteis para o diagnóstico diferencial e para o topodiagnóstico das afecções auditivas. Com base nos exames eletrofisiológicos da audição, assinale a alternativa correta.

A) Latência da onda I preservada e atraso das ondas III e/ou V; latência aumentada em qualquer intensidade na onda V; representam sinais sugestivos de alterações do tipo cocleares.
B) Os potenciais evocados captados pelo aparelho de ABR envolvem respostas que estão intimamente relacionados com a sensação auditiva, no entanto, não estão relacionados com a inteligibilidade de fala.
C) As emissões otoacústicas podem ser utilizadas na Triagem Auditiva Neonatal, no entanto, este método não quantifica a audição, contudo, é bastante eficiente, simples, rápido e objetivo para identificação das deficiências auditivas congênitas, peri e neonatais que acometem as células ciliadas internas.
D) Quando os achados das emissões otoacústicas transientes não forem compatíveis com os da audiometria e as otoemissões estiverem presentes em limiares tonais piores que 25 dBNA, suspeita-se que haja um comprometimento retrococlear ou de células ciliadas externas.
E) O ABR capta respostas nas freqüências entre 1000-4000 Hz e não envolve respostas acima do colículo inferior.

24 - Com base na perspectiva de Behlau e Pontes no que diz respeito à atuação fonoaudiológica nas laringectomias parciais, assinale a alternativa incorreta.

A) A avaliação perceptivo-auditiva é utilizada na detecção de distúrbios e caracterização do tipo de voz, tais como: ressonância, ataque vocal, tessitura vocal, qualidade vocal, velocidade de fala e respiração, loudness, pitch, tensão geral do aparelho fonador, espectrografia acústica, ressonância e qualidade da emissão vocal.
B) Os casos de laringectomias parciais, o trabalho do fonoaudiólogo tem sido chamado de fonoterapia agressiva, já que os exercícios fornecidos utilizam forças de oclusão de trato vocal, hipertonicidade de musculatura paralaríngea e auxílio de movimentação dos membros superiores na tentativa de reduzir o espaço laríngeo criado.
C) O uso de sons plosivos tem como objetivo solicitar a coaptação das pregas vocais, melhorar a função de articulação, além da clareza da emissão reforçando a cavidade oral como ressonador.
D) Na técnica de mudança de posição de cabeça deve-se procurar a posição em que o paciente apresente melhor produção vocal. A estimulação deverá ser feita rodando a cabeça homolateralmente ao lado paralisado.
E) Nas laringectomias parciais, a orientação deve dar destaque a importância de oclusão do traqueostoma para tentativas de comunicação e deglutição, além da acentuação dos movimentos da articulação na comunicação oral.

25 - Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e marque a alternativa que correlaciona a seqüência correta entre os principais músculos intrínsecos da laringe de acordo com sua respectiva função.

(1) Músculos Adutor da Glote
(2) Músculos Abdutor da Glote
(3) Músculo (Fascículo) Tensor da Glote
(4) Músculo (Fascículo) Relaxador da Glote

( ) Músculo Crico-aritenoideo Posterior.
( ) Fascículo Tireo-muscular do Músculo Tireóideo.
( ) Músculo Crico-aritenoideo lateral.
( ) Músculo Crico-aritenoideo lateral.

A) 2, 3, 1, 4.
B) 1, 4, 2, 3.
C) 1, 3, 2, 4.
D) 2, 4, 1, 3.
E) 2, 4, 2, 3.

www.pciconcursos.com.br

26 - A traqueostomia é o procedimento indicado para alguns pacientes com comprometimento grave da função respiratória. Com base nos pacientes submetidos à traqueostomia, analise as proposições abaixo em verdadeira (V) ou falsas (F) quanto as características do paciente traqueostomizado, indicação para uso do traqueostoma, orientação fonoaudiológica e os candidatos aptos ao uso de válvula de fala. Por fim, assinale a alternativa correta.

( ) A traqueostomia é necessária nos casos de: remoção de secreções traqueobrônquicas, necessidade de ventilação mecânica prolongada, proteção de vias aéreas contra aspiração, evitar seqüelas da entubação prolongada.

( ) A presença de traqueóstomo influi na redução da atividade ciliar e na integridade da mucosa traqueal, resultando em aumento das secreções, em risco de aspiração e de infecções.

( ) São exemplos de orientações dadas pelo fonoaudiólogo aos pacientes que desejam usar válvula de fala: sempre retirar a válvula antes de dormir; lavar a válvula a cada dois dias com uma solução de água oxigenada, soro fisiológico e sabão; antes de conectar a válvula à cânula de traqueostomia observar se o cuff está insuflado; orientar a substituir a válvula a cada 60 dias ou em caso de rompimento da membrana.

( ) As pneumonias do tipo aspirativo, em pacientes traqueostomizados, costumam acometer a base do lobo pulmonar direito ou os segmentos superiores dos lobos superior e médio.

( ) As válvulas de fala são indicadas aos pacientes traqueostomizados que não tenham dependência do ventilador mecânico e que tenham a capacidade de articular os fonemas.

A) V, V, V, F, F.
B) V, F, F, F, F.
C) V, V, F, V, F.
D) F, V, F, V, F.
E) V, V, F, F, V.

27 - Paciente A. C. S., 23 anos, sexo masculino, foi encaminhado ao setor de fonoaudiologia após avaliação Otorrinolaringológica onde constatou-se pregas vocais íntegras e ausência de lesões teciduais, coaptação glótica incompleta com presença de fenda triangular do tipo médio-posterior, além de ausência de qualquer problema hormonal e emocional. Ao ser analisado as características vocais e corporais observou-se: esforço fonatório intenso, fadiga vocal, voz aguda e limitação na eficiência vocal, características iniciadas no início da puberdade e que com o passar dos anos passou a provocar estranhamento por parte das outras pessoas e confusão com voz feminina ao telefone. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa que melhor se enquadra com a descrição do caso clínico, assim como as estratégias terapêuticas possíveis de serem utilizadas neste caso específico.

A) Mutação vocal incompleta. Estratégia Terapêutica-Técnica do B prolongado, manipulação digital da laringe com pressionamento ântero-posterior, técnica de empuxo.
B) Mutação vocal prolongada. Estratégia terapêutica – Fonação inspiratória, técnica do som basal, deslocamento digital da laringe para baixo durante fonação.
C) Sulco vocal após rompimento de cisto epidermóide durante muda vocal. Estratégia Terapêutica – Técnico do empuxo, escalas musicais em descendentes, técnica de sons nasais.
D) Mutação Vocal retardada. Estratégia Terapêutica – Firmeza glótica, técnica do sniff, escalas musicais em ascendentes.
E) Falsete mutacional. Estratégia Terapêutica – Técnica do empuxo, ataques vocais bruscos, técnica de sons nasais.

28 - Para que ocorra fonação, durante a expiração do ar proveniente dos pulmões é necessário uma seqüência de fenômenos que integram o ciclo vibratório das pregas vocais, convertendo este movimento vibratório em som. Analise as proposições de I a V e esquematize a ordem correta de eventos que ocorre durante a produção de 01 ciclo vibratório de pregas vocais em condições de normalidade, na qual se inicia por adução completa de glote.

I – Por efeito da elasticidade das pregas vocais e redução da pressão aérea entre as pregas vocais, estas começam a retornar à posição de repouso;

II – Adução completa das pregas vocais até o início de um novo ciclo vibratório das mesmas;

III – As pregas vocais iniciam seu contato mútuo, mas ocorre inicialmente na porção mais inferior das pregas vocais;

IV – Com a pressão dirigida, apenas resta em adução a porção mais superior das pregas vocais, ficando prestes a abrir, então, produz-se abdução das pregas vocais permitindo a passagem do fluxo aéreo;

V – A pressão do fluxo expiratório produz uma força que atua verticalmente de baixo para cima, por baixo das pregas vocais, a pressão pode deformar inferiormente as pregas vocais.

A) II – IV – I – III – V.
B) III – V – I – II – IV.
C) IV – I – III – II – V.
D) II – III – I – IV – V.
E) V – IV- I – III – II.

PCI Concursos

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Relatório

Senhor Superintendente.

Tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação de Vossa Senhoria o relatório das diligências que nesse sentido efetuei.

No dia 23 de julho de 1988 dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti n. 146.801, pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-nos que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira - 18 de março de 1988 - apenas para executar alguma tarefa de caráter particular. Não a devolveu na segunda-feira, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por motivo de doença. Quando retornou ao serviço dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue anexo ao presente relatório; a devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia.

Do exposto conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, mas apenas negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar tarefa particular. Foi irresponsável. Não cometeu qualquer ato criminoso.

Não me convence seja necessário impor-se a instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu. É o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos de minha distinta consideração.

São Paulo, 25 de julho de 1988. Cláudio da Costa

29 - Das afirmações seguintes:
I – O objetivo principal do texto é fornecer informações para uma investigação.
II – É possível afirmar que no relatório lido constam as conclusões dos fatos analisados, o relato dos fatos ocorridos e o cargo da autoridade a quem é redigido.
III – Com relação a oração inicial do texto “Tendo sido designado por Vossa Senhoria...”, pode-se afirmar que tem valor “causal”.

A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Apenas o item II está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – O propósito do texto ao apresentar datas é de documentar os fatos mencionados.
II – A única irregularidade identificada nos acontecimentos narrados é a não devolução da máquina de escrever.
III – Um segmento do texto capaz de mostrar a conclusão à que chegou o autor do relatório é “Não cometeu qualquer ato criminoso”.

A) Estão corretos os itens I e III.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Apenas o item I está correto.
E) Todos estão corretos.

A questão 31 refere-se aos quadrinhos seguintes:

31 - Das afirmações seguintes:
I – Na frase “Se você continuar aí por mais tempo...”, o verbo destacado encontra-se no “infinitivo”.
II – No último quadrinho o verbo “TER” foi flexionado no “presente do subjuntivo” e expressa dúvida, incerteza.
III – O emprego do pronome oblíquo TE junto ao verbo VER (2º quadrinho) mostra que houve uniformidade de tratamento, considerando a fala de Jon no 1º quadrinho na 3ª pessoa do singular.

A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Todos estão incorretos.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.

32 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada foi empregada de forma incorreta:

A) Todos nós devemos fluir a vida, que é fugaz.
B) Um dos jogadores de basquete infringiu as regras.
C) A disseminação do vírus nesta região é iminente.
D) O salva-vidas emergiu do mar e carregou o afogado até a praia.
E) O homem acabou de almoçar e foi fazer a sesta.

33 - Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, o processo de formação das palavras boquiaberto, subalimentado e empalidecer.

A) composição por justaposição – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
B) composição por aglutinação – derivação prefixal e sufixal – derivação parassintética.
C) composição por aglutinação – derivação parassintética – derivação prefixal e sufixal.
D) onomatopeia – derivação prefixal e sufixal – derivação prefixal.
E) hibridismo – derivação sufixal – derivação parassintética.

PCI Concursos
www.pciconcursos.com.br

34 - Preenchendo corretamente as lacunas da frase "____ vezes retornava ____ terra natal e ia ____ fazenda andar ____ cavalo", temos:

A) Às – à – a – a
B) Às – a – à – a
C) As – à – à – à
D) As – a – à – à
E) Às – à – à – a

35 - Na oração: "mas o céu ainda estava salpicado de papel colorido", a função sintática do termo destacado é:

A) objeto indireto
B) complemento nominal
C) predicativo do sujeito
D) agente da passiva
E) objeto direto

36 - Qual das alternativas apresenta erro de concordância verbal?

A) Túlio é as delícias das tias.
B) Fui eu quem chegou na hora.
C) Minas Gerais provoca emoções diferentes.
D) A multidão delirava com o meu charme.
E) A maior parte é jovens.

37 - Todas as orações seguintes apresentam regência verbal correta, exceto:

A) O magistério implica em muita vocação.
B) Aquela menina assiste em Araruama.
C) Aspirei seu perfume com saudade.
D) O sol declinava no horizonte.
E) Geórgia serviu o lanche.

38 - Identifique a figura de linguagem presente na tira seguinte:



A) prosopopeia
B) hipérbole
C) eufemismo
D) antítese
E) gradação

39 - Assinale o item em que há oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio.

A) Vendo o mestre, os alunos foram ao seu encontro.
B) O Brasil, tornado independente em 1822, possui petróleo.
C) Terminada a festa, voltamos para casa.
D) Estou mais magro que uma tábua.
E) Comeu tanto, que se sentiu mal.

40 - O emprego da vírgula está correto em todas as alternativas, exceto em:

A) Quer dizer que você, então, não foi mais a Londres?
B) O tempo faz esquecer as dores, extingue as vinganças, apazigua a cólera, reprime o ódio.
C) Vencemos; estamos, portanto, eufóricos.
D) Ele pensa uma coisa e, diz outra.
E) A mulher se levantou, e caiu a muleta.

www.pciconcursos.com.br